ROBERT KOCH INSTITUT

# تقويم التطعيم

اللغة: العربية

**يجب إعطاء التطعيمات في أقرب وقت ممكن.**
التحقق من حالة التطعيم أمر منطقي ومفيد في جميع الأعمار. يجب إجراء التطعيمات الناقصة على الفور، وفقًا للتوصيات الخاصة بالعمر.

**توصيات لجنة التطعيم الدائمة**
(STIKO), 2024. www.stiko.de

| التطعيم / العُمْر | بالأسابيع | | | بالشهور | | | | | | | | | بالسنوات | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | 2 | 3 | 4 | 5-10 | 11* | 12 | 13-14 | 15 | 16-23 | 2-4 | 5-6 | 7-8 | 9-14 | 15-16 | 17 | من عمر 18 فأكثر | من عمر 60 فأكثر |
| | | | | | U5 | U6 | | | | U7 | U7a/U8 | U9 | U10 | U11/J1 | | J2 | | |
| الفيروسات العجلية | | [a] G1 | G2 | (G3) | | | | | | | | | | | | | | |
| الكزاز (التيتانوس) [b] | | G1 | N | G2 | N | [c] G3 | | | | N | | A1 | N | A2 | | N | [f] A | |
| الخناق (الدفتيريا) [b] | | G1 | N | G2 | N | [c] G3 | | | | N | | A1 | N | A2 | | N | [f] A | |
| السعال الديكي [b] الشاهوق (بيرتوسيس) | | G1 | N | G2 | N | [c] G3 | | | | N | | A1 | N | A2 | | N | [f] A3 | N |
| المستديمة النزلية النوع ب (Hib) [b] المستديمة النزلية نوع ب | | G1 | N | G2 | N | [c] G3 | | | | N | | | | | | | | |
| شلل الأطفال [b] شلل الأطفال (بوليوميليتيس) | | G1 | N | G2 | N | [c] G3 | | | | N | | | N | A1 | | | N | |
| التهاب الكبد نوع ب [b] | | G1 | N | G2 | N | [c] G3 | | | | | | | N | | | | | |
| المكورات الرئوية [b] | | G1 | N | G2 | | [c] G3 | | | | N | | | | | | | | [h] S |
| المكورات السحائية ب [d] | | G1 | N | G2 | N | | [d] G3 | | | | N | | | | | | | |
| مرض الحصبة | | G1 | | | | G1 | | N | G2 | | | | N | | | | [g] S | |
| النكاف والحصبة الألمانية | | G1 | | | | G1 | | N | G2 | | | | N | | | | | |
| مرض الحماق (الحماق) | | G1 | | | | G1 | | N | G2 | | | | N | | | | | |
| المكورات السحائية (نوع ج) | | | | | | | G1 | | | | | | N | | | | | |
| فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) فيروس الورم الحليمي البشري | | | | | | | | | | | | | | [e] G1 G2 | N | | | |
| كوفيد -19 | | | | | | | | | | | | | | | | | [i] S | |
| الحلأ النطاقي (الهربس) | | | | | | | | | | | | | | | | | [j] G1 G2 [j] | |
| الزكام (الإنفلونزا) | | | | | | | | | | | | | | | | | S (سنويًا) | |

**مواعيد التطعيم التالية**

**شرح وتوضيحات**

- G **التطعيم الأساسي** (خلال الفترة لما يصل إلى 3 جرعات تطعيم جزئية *G1 – G3*)
- S **التطعيم المعياري**
- A **تجديد التطعيم**
- N **الحصول على التطعيم في وقت لاحق** (التطعيم الأساسي لجميع الذين لم يتم تطعيمهم بعد، أو استكمال سلسلة التطعيمات غير المكتملة)
- U **الفحص الاستباقي للكشف المبكر**
- J **فحص الشباب** (في الفترة العمرية 12–14 سنة *J1*)

[a] جرعة اللقاح الأولى من عمر 6 أسابيع، حسب اللقاح المستخدم. 2 أو 3 جرعات لقاح على فترة زمنية لا تقل عن 4 أسابيع.
[b] الأطفال الخدج: جرعة لقاح إضافية عند عمر 3 أشهر، أي 4 جرعات لقاح في المجموع.
[c] أدنى فترة زمنية للجرعة السابقة: 6 شهور.
[d] 3 جرعات تُؤخذ من سن شهرين إلى 23 شهرًا؛ ومن سن 24 شهرًا، وتتألف سلسلة التطعيم من جرعتين.
[e] جرعتان من اللقاح على فترة زمنية لا تقل عن 5 أشهر، مع التطعيم التعويضي بدءًا من عمر فوق 14 عامًا أو بفاصل تطعيم زمني أقل من 5 أشهر بين الجرعة الأولى والثانية. الجرعة الثالثة ضرورية.
[f] التطعيم المعزز ضد مرض التيتانوس والدفتيريا (Td) كل 10 سنوات. التطعيم التالي الواجب هو لقاح ضد مرض التيتانوس والدفتيريا (Td) مرة واحدة في صورة لقاح التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي أو، إذا تم تحديده، كتطعيم التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي – شلل الأطفال معطل النشاط المركب.
[g] التطعيم الفردي بلقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية لجميع الأشخاص المولودين بعد 1970 الذين يبلغ عمرهم ≥ 18 عامًا مع حالة تطعيم غير واضحة، بدون تطعيم أو مع تطعيم واحد فقط في الطفولة.
[h] يُوصى بأخذه مع لقاح المكورات الرئوية (PCV 20).
[i] يلزم مواجهة المستضد ثلاث مرات (على الأقل)، لحماية الأفراد غير المصابين بالمرض الأساسي، ويجب أن تكون واحدة منها على الأقل في شكل تطعيم. التطعيم بلقاح الـ 23 عديد السكاريد.
* يمكن توزيع التطعيمات على عدة مواعيد تطعيم. يمكن إعطاء RMM وV في نفس التاريخ أو كل 4 أسابيع.