

# ИМУНИЗАЦИОНЕН КАЛЕНДАР

Sprache: Bulgarisch

ИМУНИЗАЦИЯ ВЪЗРАСТ

**Имунизациите трябва да се правят във възможно най-ранния момент.**  
Проверката на имунизационния статус има смисъл във всички възрасти. Липсващите имунизации трябва да се наваксат веднага, в съответствие с препоръките за всяка една възраст.

**Препоръки на Постоянната комисия по ваксините (STIKO), 2024. www.stiko.de**

ROBERT KOCH INSTITUT



	след седмици:			след месеци						след години											
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	с 18	с 60			
	U4			U5			U6			U7		U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	
Ротавируси	G1 <sup>a</sup>			G2	(G3)																
Тетанус <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1		N	A2		N	A <sup>f</sup>						
Дифтерия <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1		N	A2		N	A <sup>f</sup>						
Пертусис <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1		N	A2		N	A3 <sup>f</sup>		N				
Хемофилус инфлуенце тип B <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N															
Полиомиелит <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N			A1		N										
Хепатит B <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N															
Пневмококи <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N													S <sup>h</sup>		
Менингококи от група B <sup>d</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N														
Морбили						G1	N	G2		N			S <sup>g</sup>								
Паротит, рубеола						G1	N	G2		N											
Варицела						G1	N	G2		N											
Менингококи						G1		N													
Човешки папилома вируси											G1 G2 <sup>e e</sup>		N								
COVID 19																G <sup>i</sup>	S <sup>i</sup>				
Херпес зостер																G1 G2 <sup>j j</sup>					
Инфлуенца																S <sup>(годишно)</sup>					

Следващи дати за имунизация



## РАЗЯСНЕНИЯ

- G** ОСНОВНА ИМУНИЗАЦИЯ  
(с до 3 частични имунизации G1-G3)
- S** СТАНДАРТНА ИМУНИЗАЦИЯ
- A** РЕИМУНИЗАЦИЯ
- N** СЛЕДВАЩА ИМУНИЗАЦИЯ  
(основна имунизация на всички, които все още не са ваксинирани или завършване на непълна поредица от имунизации)
- U** Рани диагностични прегледи
- J** Превантивен преглед за младежи  
(J1 на възраст от 12-14 години)

- a** Първата доза ваксина е на възраст 6 седмици, според използваната ваксина 2 или 3 дози в разстояние минимум 4 седмици.
- b** Родени преждевременно: допълнителна доза ваксина на възраст от 3 месеца, т.е. общо 4 дози ваксина.
- c** Минимален интервал от предходната доза: 6 месеца
- d** 3 дози на възраст от 2 до 23 месеца; след навършване на 24 месеца серията от ваксини се състои от 2 дози.
- e** Две дози ваксина в разстояние минимум на 5 месеца, при наваксване на имунизация започваща от възраст ≥ 15 години или при интервал от < 5 месеца между 1-вата и 2-рата доза е необходима една

- 3-та доза.
- f** Реимунизация за тетанус на всеки 10 години. Следващата имунизация за Td еднократно като Tdap или при съответни индикации като комбинирана ваксина Tdap-IPV.
- g** Еднократна имунизация с ваксина за морбили, паротит и рубеола /MMR/ за всички лица, одени след 1970 година ≥ 18 години с неясен имунизационен статус, без имунизации или само с една имунизация в детството.
- h** Препоръчва се с PCV20
- i** За предпазване на лица без съпътстващо заболяване, са необходими (най-малко) 3 контакта с

- антиген, като поне един от които трябва да бъде ваксинация.
  - j** Повторна бустерна ваксинация на интервал най-малко 12 месеца от последния контакт с антиген, за предпочитане през есента
- \* Имунизациите могат да бъдат разпределени на няколко приема на ваксината. Ваксината за морбили, паротит, рубеола /MMR/ и тази за варицела /V/ може да бъде дадена в същия прием или в интервал от 4 седмици.