



زمان های بعدی واکسناسیون



واکسناسیون	بر حسب ماه						بر حسب سال						سن						
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6		7-8	9-14	15-16	17	18 سال و بالاتر	60 سال و بالاتر
روتاویروس ها																			
تیتانوس <sup>b</sup>	G1 <sup>a</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>						A1	N	A2	N	Af			
دیفتری <sup>b</sup>	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>						A1	N	A2	N	Af			
سیاه سرفه <sup>b</sup> سیاه سرفه	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>						A1	N	A2	N	A3 <sup>f</sup>	N		
Hib <sup>b</sup> هموفیلوس انفلونزای نوع b	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
پولیو <sup>b</sup> پولیو	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
هپاتیت B <sup>b</sup>	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
پنوموکوک ها <sup>b</sup>	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
مننگوکوک B <sup>d</sup>	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
سرخکان	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
کله چرک، سرخچه	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
چیچک وار سیلا	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
منینجوکوک های C	G1	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>													
HPV وایرس های پاپیلوماوی انسانی																			
کووید-19																			
هریس زوستر (زونا)																			
گریپ انفلونزا																			

توضیحات

- G** ایمنسازی اساسی
- (در حداقل 3 مرتبه واکسناسیون)
- S** G3 – G1
- واکسناسیون استتدر
- A** واکسناسیون یادآوری
- N** واکسناسیون جبرانی
- (ایمنسازی اساسی تمام اشخاصی که تا حالا واکسن نشده اند یا تکمیل یک سلسله واکسناسیون ناقص)
- U** معاینه تشخیص زودهنگام
- J** معاینه جوانان
- (در سنین 12-14 سالگی J1)

<sup>a</sup> یک بار واکسناسیون با واکسن سرخکان، کله چرک و سرخچه (MMR) برای همه اشخاص متولد شده بعد از سال 1970 در سن 18 سال یا بالاتر از آن با وضعیت واکسناسیون نامشخص، بدون واکسناسیون یا با صرفاً یک واکسناسیون در دوران طفولیت. با PCV20 توصیه می شود برای محافظت از افراد بدون مریضی نهفته، (حداقل) 3 تماس اتنی ژن لازم است که حداقل یکی از آنها باید واکسناسیون باشد. <sup>b</sup> واکسناسیون با واکسن پولی سکراید 23 ظرفیتی. <sup>c</sup> واکسناسیون ها ممکن است به چندین زمان واکسناسیون تقسیم شوند. واکسن سرخکان، کله چرک و سرخچه (MMR) و واریسلا\* (V) در یک زمان یا در فاصله زمانی 4 هفته ای قابل تزریق هستند.

<sup>a</sup> دوز اول واکسن از سن 6 هفتگی به بالا، بسته به واکسن مورد استفاده 2 یا 3 دوز واکسن در فاصله زمانی حداقل 4 هفته. <sup>b</sup> نوزادان زودرس: دوز تکمیلی واکسن در سن 3 ماهگی، یعنی در مجموع 4 دوز واکسن. <sup>c</sup> حداقل فاصله زمانی الی دوز قبلی: 6 ماه. <sup>d</sup> 3 دوز در سن 2 تا 23 ماهگی؛ از سن 24 ماهگی، سری واکسناسیون شامل 2 دوز است. <sup>e</sup> دو دوز واکسن در فاصله زمانی حداقل 5 ماه، در مورد واکسناسیون جبرانی که در سن بالاتر از 14 سالگی آغاز می شود یا در فاصله زمانی واکسناسیون کمتر از 5 ماه بین دوز اول و دوم، دوز سوم ضروری است. <sup>f</sup> واکسناسیون یادآوری تیتانوس و دیفتری (Td) هر 10 سال. واکسناسیون ضروری بعدی تیتانوس و دیفتری 1 (Td) بار بصورت واکسناسیون تیتانوس، دیفتری و سیاه سرفه (Tdap) یا در صورت تجویز مربوطه بصورت واکسناسیون ترکیبی تیتانوس، دیفتری و سیاه سرفه (Tdap) و واکسن غیر فعال در مقابل مرض پولیو (IPV).