



زمان‌های بعدی واکسیناسیون

واکسیناسیون	بر حسب هفته			بر حسب ماه										بر حسب سال					
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	18 سال و بزرگتر	60 سال و بزرگتر	
	U4			U5		U6		U7		U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	
روتاویروس‌ها	G1 ^a			G2	(G3)														
کزاز	G1	N	G2	N	G3 ^c														
دیفتری	G1	N	G2	N	G3 ^c														
سیاه سرفه سیاه سرفه	G1	N	G2	N	G3 ^c														
Hib هپوفیلوس آنفلوانزای نوع b	G1	N	G2	N	G3 ^c														
فلج اطفال فلج اطفال	G1	N	G2	N	G3 ^c														
هیپاتیت B	G1	N	G2	N	G3 ^c														
پنوموکوک‌ها	G1	N	G2	N	G3 ^c														
مننگوکوک B	G1	N	G2	N	G3 ^d														
سرخک	G1	N	G2	N	G3 ^e														
اوربون، سرخچه	G1	N	G2	N	G3 ^e														
آبله مرغان واریسلا	G1	N	G2	N	G3 ^e														
متنوزوکوک‌های C	G1																		
HPV ویروس‌های پاپیلومای انسانی	G1 G2 ^e																		
کووید ۱۹	S ⁱ																		
هریس زوستر (زونا)	G1 G2																		
گریپ آنفلوانزا	S (سالانه)																		



توضیحات

G این‌سازی پایه (در حداکثر 3 نوبت واکسیناسیون G1 – G3)

S واکسیناسیون استاندارد

A واکسیناسیون یادآوری

N واکسیناسیون جبرانی

(این‌سازی پایه تمام افرادی که تا کنون

واکسینه نشده‌اند یا تکمیل یک سری

واکسیناسیون ناقص)

U معاینه تشخیص زودهنگام

J معاینه جوانان (J1 در سنین 12-14 سالگی)

G یک بار واکسیناسیون با واکسن سرخک، اوربون و سرخچه (MMR) برای همه افراد متولد شده پس از سال 1970 در سن 18 سال یا بالاتر از آن با وضعیت واکسیناسیون نامشخص، بدون واکسیناسیون یا با فقط یک واکسیناسیون در دوران کودکی.

h توصیه‌شده یا PCV20

I برای محافظت از اشخاص بدون بیماری زمینه‌ای، (حداقل) 3 تماس آنتی‌ژنی لازم است، حداقل یکی از آن‌ها باید واکسیناسیون باشد.

واکسیناسیون با واکسن پلی ساکارید 23 ظرفیتی.

* واکسیناسیون‌ها ممکن است به چندین زمان واکسیناسیون تقسیم شوند. واکسن سرخک، اوربون و سرخچه (MMR) و واریسلا (V) در یک زمان یا در فاصله زمانی 4 هفته‌ای قابل تزریق هستند.

a دوز اول واکسن از سن ۶ هفته‌گی به بالا، بسته به واکسن مورد استفاده ۲ تا ۳ دوز واکسن در فاصله زمانی حداقل ۴ هفته.

b نوزادان زودرس: دوز تکمیلی واکسن در سن ۳ ماهگی، یعنی در مجموع ۴ دوز واکسن.

c حداقل فاصله زمانی تا دوز قبلی: ۶ ماه.

d ۳ دوز در سن ۲ تا ۲۳ ماهگی؛ از سن ۲۴ ماهگی به بعد، مجموعه واکسیناسیون شامل ۲ دوز می‌شود.

e دو دوز واکسن در فاصله زمانی حداقل ۵ ماه، در مورد واکسیناسیون جبرانی که در سن بالای ۱۴ سال آغاز می‌شود یا در فاصله زمانی واکسیناسیون کمتر از ۵ ماه بین دوز اول و دوم، دوز سوم ضروری است.

f واکسیناسیون یادآوری کزاز و دیفتری (Td) هر ۱۰ سال. واکسیناسیون ضروری بعدی کزاز و دیفتری (Td) ۱ بار به صورت واکسیناسیون کزاز، دیفتری و سیاه سرفه (Tdap) یا در صورت تجویز مربوطه به صورت واکسیناسیون ترکیبی کزاز، دیفتری و سیاه سرفه (Tdap) و واکسن غیر فعال در برابر بیماری فلج اطفال (IPV).