

CALENDRIER DE VACCINATION

Sprache: Französisch

Les vaccins doivent être administrés le plus tôt possible.

Il est conseillé de vérifier le statut vaccinal à tout âge. Les vaccinations manquantes doivent être effectuées immédiatement selon les recommandations relatives à l'âge respectif.

Recommandations de la Commission permanente allemande de vaccination (STIKO), 2024. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



VACCINATION ÂGE

VACCINATION	en semaines			en mois							en années														
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	≥ 18	≥ 60							
	U4				U5				U6				U7			U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	
Rotavirus	G1 ^a		G2	(G3)																					
Tétanos ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N				A1	N	A2	N	A ^f											
Diphtérie ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N				A1	N	A2	N	A ^f											
Pertussis ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N				A1	N	A2	N	A3 ^f	N										
Haemophilus influenzae Type b ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N																			
Poliomyélite ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N							A1	N											
Hépatite B ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N																			
Pneumocoques ^b	G1	N	G2	N	G3 ^c	N											S ^h								
Méningocoque B ^d	G1	N	G2	N	G3 ^d		N																		
Rougeole					G1	N	G2	N							S ^g										
Oreillons, rubéole					G1	N	G2	N																	
Varicelle					G1	N	G2	N																	
Méningocoques C					G1		N																		
Papillomavirus humains													G1 G2 ^e		N										
COVID 19															G ⁱ	S ⁱ									
Herpès zoster (zona)															G1 G2 ^j										
Influenza															S ^k		(tous les ans)								

Prochaines dates de vaccination



EXPLICATIONS

G IMMUNISATION DE BASE

(jusqu'à 3 vaccinations partielles)

S G1 – G3)

A VACCINATION STANDARD

N VACCINATION DE RAPPEL

VACCINATION DE RATTRAPAGE

(immunisation de base de tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou achèvement d'une série de vaccina-

U tions incomplète)

J Test de dépistage

Examen des jeunes

(J1 à l'âge de 12-14 ans)

a Première dose dès l'âge de 6 semaines, 2 ou 3 doses de vaccin à des intervalles d'au moins 4 semaines, selon le vaccin utilisé.

b Prématurés : dose de vaccin supplémentaire à l'âge de 3 mois, soit 4 doses de vaccin au total.

c Durée minimale par rapport à la dose précédente : 6 mois.

d 3 doses à l'âge de 2 à 23 mois ; à partir de l'âge de 24 mois, la série de vaccination comprend 2 doses.

e Deux doses de vaccin à un intervalle d'au moins 5 mois, en cas de vaccination de rattrapage commençant après l'âge de 15 ans ou avec des intervalles de vaccination inférieurs à 5 mois entre la 1ère et la 2ème dose, une 3ème dose est nécessaire.

f Vaccination de rappel contre le tétanos et la diphtérie (Td) tous les 10 ans. La prochaine vaccination Td doit être administrée une fois sous forme de Tdap ou, si cela est indiqué, sous forme de vaccin combiné Tdap-VPI.

g Une seule injection avec un vaccin ROR pour toutes les personnes nées après 1970 et âgées de plus de 18 ans dont le statut vaccinal n'est pas clair, n'étant pas vaccinées, ou n'ayant reçu qu'une seule injection pendant l'enfance.

h Recommandé avec le PCV20

i Pour protéger les personnes qui ne souffrent pas d'une maladie sous-jacente, (au moins) trois contacts avec

l'antigène sont nécessaires, dont au moins l'un d'eux doit être une vaccination.

j Vaccination de rappel répétée avec un intervalle minimum de 12 mois à compter du dernier contact avec l'antigène, de préférence à l'automne

* Les vaccinations peuvent être réparties sur plusieurs dates.

Le vaccin ROR et le vaccin contre la varicelle peuvent être administrés à la même date ou selon un intervalle de 4 semaines.