



د راتلونکي واکسین ملاقات



توضیحات

- G** ابتدایی مصنویت معیاري (تر 3 ستونو پورې G1 – G3)
- S** واکسین
- A** پرمخ وړونکی واکسین
- N** پاتي واکسین

(د ټولو هغه افرادو لپاره چې تراوسه واکسین شوي ندي یا د واکسینو نا مکمل لړۍ بشپړول)

**U** د پيلي کشف معاینه

**J** د خواناتو معاینه

(په 12-14 کلنۍ کې J1)

واکسین	په میاشتو کې																	په اونيو کې	
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	18 کلن او ډیر عمر لرونکي	60 کلن او ډیر عمر لرونکي	
روتاویروس																			
ټیټانوس <sup>b</sup>	G1	N	G2	G3															
دیفټیریا <sup>b</sup>	G1	N	G2	G3															
ټور ټوخی <sup>b</sup> (پیرټوسس)	G1	N	G2	G3															
ایچ.ای.بی <sup>b</sup> هایمو فیلس انفلونزا نوع b	G1	N	G2	G3															
ګوزن یا پولیو <sup>b</sup> پولیومیلیتس	G1	N	G2	G3															
ټور زیری <sup>b</sup>	G1	N	G2	G3															
نوموکوکسی <sup>b</sup>	G1	N	G2	G3															
د ماشوم د ناروغی ویروسونه لامل کېدونکی <sup>c</sup> ناروغی په وړاندې د ساتنې واکسین	G1	N	G2	G3															
شری	G1	N	G2	G3															
ډډیفونی، روپیلا	G1	N	G2	G3															
چکن پاکس وریسلا	G1	N	G2	G3															
مینینګوکوکک سی	G1																		
ایچ.پی.وی انسانې پپیلوما ویروس	G1 G2																		
کووید-19	S																		
هرپس زوسټر	G1 G2																		
انفلونزا انفلونزا	S (کلنۍ)																		

\* واکسین واکسین د واکسینو څو ملاقاتانو باندې ویشل کېدی شي. ایم. ایم. آر او وي په یوه ملاقات کې یا د 4 اونيو په وقفه کې کېدی شي.

<sup>f</sup> د ټي بوسټر واکسین هر 10 کلونو کې. بل ټي ډي واکسین یو دوز ته د ټي ډيپ په توګه اړتیا ده یا، د اړوند نښې په صورت کې، د ټي ډيپ – آی.پی.وی ترکیبي واکسین.  
<sup>g</sup> د ټولو هغه افرادو لپاره یو – ځلي د ایم.ایم. آر واکسین چې د 1970 نه وروسته زیږیدلي  $\leq 18$  کلن د واکسینو میهم وضعیت سره، د مخکیني واکسینو پرته یا په ماشومتوب کې یوازې یو واکسین سره.  
<sup>h</sup> د PCV20 سره وړاندیز شوی  
<sup>i</sup> د هغو کسانو د ساتنې لپاره چې د لامل په توګه د پام وړ ناروغی پرته، (لږترلږه) د معافیت سیستم لخوا تولید شوي محافظتي لوی، پیچلي مالیکولونه 3 تماسونو ته اړتیا لري، په کوم کې چې باید لږترلږه یو واکسین وي.  
<sup>j</sup> د 23 – والنټ پولیساکرایډ واکسین کول.

<sup>a</sup> د واکسین لومړی دوز د 6 اونيو عمر کې؛ چې کارول شوي واکسین پورې اړه لري 2 یا 3 د واکسین دوزونه د لږترلږه 4 اونيو وقفه کې.  
<sup>b</sup> نارسیډي یا بی مودي ماشومان: د واکسینو اضافي دوز په 3 میاشتې کې، لکه ټولټال د واکسین 4 دوز.  
<sup>c</sup> د مخکیني دوز څخه لږترلږه واټن: 6 میاشتې.  
<sup>d</sup> 3 د درملو مقدار د 2 عمر لرونکو ماشومانو څخه تر 23 میاشتو عمر لرونکو لویانو پورې؛ د 24 میاشتو عمر لرونکو لویانو څخه، د واکسین لړۍ د 2 درملو مقدار څخه جوړه شوي دي.  
<sup>e</sup> دوه واکسین د یوې نه لږترلږه د 5 میاشتو په واټن کې؛ د پاتي واکسینونو پوره کولو په صورت کې په  $< 14$  کلنۍ عمر کې یا د واکسینو د  $> 5$  میاشتو وقفه د 1 یا لومړي او 2م دوز ترمینځ، 3م دوز لازمي دی.