

CALENDARUL VACCINĂRILOR

Sprache: Rumänisch

Vaccinările trebuie efectuate cât mai timpuriu posibil.

Verificarea vaccinărilor este importantă la orice vârstă. Vaccinările lipsă trebuie recuperate imediat în conformitate cu recomandările pentru vârsta respectivă.

Recomandările Comisiei permanente pentru vaccinare (STIKO), 2024. www.stiko.de



VACCIN	VÂRSTĂ	în săptămâni													în luni		în ani				
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	de la 18	la 60		
		U4			U5			U6			U7		U7a/U8		U9	U10	U11/J1	J2			
Rotavirusuri		G1 ^a	G2	(G3)																	
Tetanos ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N					A1	N	A2	N		A ^f		
Difterie ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N					A1	N	A2	N		A ^f		
Pertussis ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N					A1	N	A2	N		A3 ^f	N	
Haemophilus influenzae tip b ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N												
Poliomielită ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c				N						A1			N		
Hepatită B ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c					N										
Pneumococic ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N											S ^h	
Meningococul B ^d		G1	N	G2	N		G3 ^d		N												
Rujeolă						G1	N		G2					N						S ^g	
Oreion, Rubeolă						G1	N		G2					N							
Varicelă						G1	N		G2					N							
Meningococic-C							G1							N							
Virusul Papiloma uman															G1 ^e G2 ^e	N					
COVID 19																			G ⁱ	S ⁱ	
Herpes zoster																				G1 ^j G2 ^j	
Influență																				S (anual)	

Data următoarei vaccinări



EXPLICAȚII

- G** IMUNIZARE PRIMARĂ
(cu până la 3 doze de vaccin G1 – G3)
- S** VACCINARE STANDARD
- A** VACCINARE DE RAPEL
- N** VACCINARE ULTERIOARĂ
(Imunizarea primară a persoanelor nevaccinate anterior resp. completarea unei serii de vaccinare nefinalizate)
- U** Examinare pentru recunoașterea timpurie
- J** Examinarea tinerilor
(J1 cu vârsta cuprinsă între 12–14 ani)

- a** Prima doză de vaccin trebuie administrată începând cu vârsta de 6 săptămâni, iar în funcție de vaccinul folosit se vor administra 2 resp. 3 doze la un interval de cel puțin 4 săptămâni.
- b** Cei născuți prematur: doză suplimentară de vaccin la vârsta de 3 luni și anume un total de 4 doze.
- c** Interval minim față de doza anterioară: 6 luni.
- d** 3 doze la vârsta cuprinsă între 2 și 23 luni; începând cu vârsta de 24 luni, seria de vaccinare constă din 2 doze.
- e** Două doze de vaccin la un interval de cel puțin 5 luni, în caz de vaccinare ulterioară începând cu vârsta de ≥ 15 ani sau la un interval de < 5 luni între vaccinările 1. și 2. este necesară a 3. doză.

- f** Vaccinare Td suplimentară la fiecare 10 ani. Următoarea vaccinare singulară Td ca vaccinare Tdap cu indicație corespunzătoare ca vaccin combinat Tdap-IPV.
- g** Vaccinare singulară cu un vaccin MMR pentru toate persoanele născute după 1970 ≥ 18 ani fără un istoric de vaccinare clar, nevaccinați sau doar cu un vaccin primit în copilărie.
- h** Recomandat cu PCV20
- i** Pentru protecția persoanelor fără o afecțiune subiacentă, sunt necesare (cel puțin) 3 contacte cu antigenul, dintre care cel puțin unul trebuie să fie o vaccinare.
- j** Vaccinare de rapel repetată la un interval de minim 12 luni de la ultimul contact cu antigen, preferabil toamna

* Vaccinurile pot fi administrate separat într-un anumit interval de timp. MMR și V pot fi administrate concomitent sau la un interval de 4 săptămâni.