

**Вакцинация должна быть проведена как можно раньше.**  
Целесообразно проверять статус вакцинации в любом возрасте. Пропущенные прививки необходимо немедленно восполнить согласно рекомендациям для соответствующего возраста.

**Рекомендации постоянной комиссии  
по вакцинации (STIKO), 2024. www.stiko.de**



**ВАКЦИНАЦИЯ ВОЗРАСТ**

	в неделях:			в месяцах							в годах											
	6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	с 18	с 60				
	U4			U5			U6				U7		U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	
Ротавирусы	G1 <sup>a</sup>		G2	(G3)																		
Столбняк <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N				A1	N	A2	N	A <sup>f</sup>								
Дифтерия <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N				A1	N	A2	N	A <sup>f</sup>								
Коклюш <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N				A1	N	A2	N	A3 <sup>f</sup>	N							
Гемофильная инфекция <sup>b</sup> инфекция Тип b	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N																
Полиомиелит <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N				A1		N										
Гепатит В <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N																
Пневмококк <sup>b</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>c</sup>	N				S <sup>h</sup>												
Менингококк В <sup>d</sup>	G1	N	G2	N	G3 <sup>d</sup>		N															
Корь					G1	N	G2	N				S <sup>g</sup>										
Свинка, краснуха					G1	N	G2	N														
Ветряная оспа					G1	N	G2	N														
Менингококк С					G1		N															
Вирус папилломы человека									G1 G2 <sup>e e</sup>		N											
Коронавирусное заболевание 2019 г.													G <sup>i</sup> S <sup>i</sup>									
Опоясывающий герпес															G1 G2 <sup>j j</sup>							
Инflюэнца																	S <sup>i</sup> (ежегодно)					

**Сроки следующей  
вакцинации**



**ПОЯСНЕНИЯ**

- G** БАЗОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ  
(до 3-х частичных прививок G1 - G3)
- S** СТАНДАРТНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
- A** РЕВАКЦИНАЦИЯ
- N** ПОСЛЕДУЮЩАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  
(Базовая иммунизация всех еще не вакцинированных или завершение неполной серии вакцинаций)
- U** Скрининговое обследование
- J** Обследование подростков  
(J1 в возрасте 12-14 лет)

**a** Первая доза вакцины с 6-недельного возраста, в зависимости от используемой вакцины, 2-ая или 3-я доза вакцины с интервалом не менее 4 недель.  
**b** Недоношенные дети: дополнительная доза вакцины в возрасте 3 месяцев, т. е. всего 4 дозы вакцины.  
**c** Минимальный интервал от предыдущей дозы: 6 месяцев.  
**d** 3 дозы в возрасте от 2 до 23 месяцев; с 24 месяцев серия прививок состоит из 2 доз.  
**e** Две дозы вакцины с интервалом не менее 5 месяцев, с дополнительной вакцинацией, начиная с возраста от 15 лет или с интервалом между вакцинациями менее 5 месяцев между 1-ой и 2-ой дозами Требуется 3-я доза.  
**f** Ревакцинация Td (против столбняка и дифтерии) каждые 10 лет. Следующая обязательная вакцинация

Td- однократная вакцинация как Tdap (против столбняка, дифтерии, коклюша) или, при наличии показаний, комбинированная вакцинация Tdap-IPV (против столбняка, дифтерии, коклюша и полиомиелита).  
**g** Одноразовая вакцинация вакциной MMR (против кори, свинки, краснухи) для всех лиц, родившихся после 1970 г. ≥ 18 лет с неясным прививочным статусом, без вакцинации или только с одной прививкой в детстве.  
**h** Рекомендуется использовать с PCV20  
**i** Для профилактики лиц без основного заболевания требуется (как минимум) 3 контакта с антигеном, по

крайней мере, один из которых должен быть вакцинацией.  
**j** Ревакцинация с интервалом не менее 12 месяцев с момента последнего контакта с антигеном вируса, проводимая предпочтительно осенью  
 \* Вакцинацию можно делать в несколько приемов. MMR (против кори, свинки, краснухи) и V можно назначать в один день или с интервалом в 4 недели.