

AŞI TAKVİMİ

Sprache: Türkisch

Aşılar en erken vakitte yapılmalıdır.

Aşı durumunun herhangi bir yaşta kontrol edilmesi mantıklıdır. Eksik aşılar ilgili yaşa ilişkin tavsiyelere uygun olarak derhal uygulanmalıdır.

Daimi Aşı Komisyonu'nun (STIKO) tavsiyeleri
(STIKO), 2024. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



AŞI	YAŞ	hafta																					
		6	2	3	4	5-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-14	15-16	17	ab 18	ab 60				
		U4			U5			U6			U7			U7a/U8		U9		U10		U11/J1		J2	
Rotavirüsler		G1 ^a	G2	(G3)																			
Tetanos ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N				A1	N	A2	N			A ^f				
Difteri ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N				A1	N	A2	N			A ^f				
Öksürüklü Boğmaca ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N				A1	N	A2	N			A3 ^f	N			
Haemophilus influenzae Tip b ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N														
Polyomiyelit ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c				N					A1				N				
Hepatit B ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c							N										
Pnömonok ^b		G1	N	G2	N	G3 ^c			N												S ^h		
Meningokok B ^d		G1	N	G2	N		G3 ^d			N													
Kızamık						G1	N		G2					N							S ^g		
Kabakulak, kızamıkçık						G1	N		G2					N									
Suçiçeği virüsü						G1	N		G2					N									
Meningokokken C							G1							N									
İnsanlarda görülen papilloma virüsleri															G1 ^e G2 ^e	N							
COVID 19																				G ⁱ	S ⁱ		
Zona																					G1 ^j G2 ^j		
Enflüanza																					S ^j (her yıl)		

Sonraki aşı tarihleri



AÇIKLAMALAR

G TEMEL AŞILAMA

(3 adede kadar kısmi aşılamada
G1 - G3)

S STANDART AŞILAMA

(Henüz aşılanmamış insanlar veya temel aşılamaya yapılacak insanlar için Tamamlanmamış bir aşılamaya serisinin tamamlanması)

A TAZELEME AŞISI

N TAKİP AŞILARI

(Henüz aşılanmamış insanlar veya temel aşılamaya yapılacak insanlar için Tamamlanmamış bir aşılamaya serisinin tamamlanması)

U Erken teşhis muayenesi

J Gençlerde yapılan araştırma
(12-14 yaşta J1)

^a Kullanılan aşıya bağlı olarak 6 haftalık bebeklerden itibaren en azından 4 hafta arayla 2 veya 3 aşılamaya dozu

^b Prematüre doğanlar: 3 aylıktan ek aşı dozu, yani Toplam 4 aşı dozu.

^c Önceki aşıdan sonra minimum süre: 6 ay

^d 2 ila 23 aylıktan 3 doz; 24 aylıktan itibaren aşı serisi 2 doz olmalıdır.

^e En azından 5 ay arayla iki aşı dozu, ≥ 15 yaştan itibaren veya 1. ve 2. Doz arasında < 5 aydan az süreyle takip aşısı yapıldığında 3. doz aşının yapılması gereklidir.

^f Her 10 yılda bir Td yenileme aşısı. Daha sonraki Td aşısı bir kez Tdap olarak veya belirtilirse Tdap-IPV

kombinasyon aşısı olarak yapılır.

^g 1970 ≥ yılından sonra doğmuş, 18 yaşını geçkin ve aşı durumu belirsiz, aşı olmadan veya çocuklukta tek bir aşı yapılmış tüm kişiler için bir MMR aşısı ile tek seferlik aşılamaya yapılması gereklidir.

^h PCV20 ile önerilir

ⁱ Altta yatan bir hastalığı olmayan bireylerin korunması için, en az biri aşı olmak üzere (en az) 3 antijen teması gerekmektedir.

^j En son antikor temasından itibaren en az 12 ay aralıklı tekrarlayan hatırlatma aşılması, tercihen sonbaharda

* Aşılar birkaç aşı randevusuna yayılabilir. MMR ve V aynı tarihte veya 4 haftada bir verilebilir.