



## اگلی ٹیکہ کاری کی اپائنٹمنٹ



## وضاحتیں

- G** بنیادی امیونائزیشن  
3 تک ٹیکہ (G3 – G1)  
**S** معیاری ٹیکہ کاری  
**A** بوسٹر ٹیکہ کاری  
**N** تلافی والی ٹیکہ کاری

(ان تمام افراد کا بنیادی امیونائزیشن  
جنہیں ابھی تک ٹیکہ نہیں لگایا گیا ہے  
یا ٹیکہ کاریوں کی نامکمل سیریز  
کی تکمیل)

- U** بروقت پتہ لگانے کے لیے معائنہ  
**J** نوجوان کا معائنہ  
(J1 سال کی عمر میں 21-41)

ٹیکہ کاری	سال میں										ماہ میں				بقتے میں	عمر			
	60 سال اور زائد	18 سال اور زائد	17	15-16	9-14	7-8	5-6	2-4	16-23	15	13-14	12	11*	5-10	4		3	2	6
روٹاوائرس			J2		U11/J1	U10	U9	U7a/U8	U7				U6	U5		U4			
ٹیتس <sup>b</sup>																			
خناق <sup>b</sup>																			
کھالی کھانسی <sup>b</sup> پرتیوسس																			
Hib <sup>b</sup> بیموفیلس انفلونزا ٹائپ b																			
پولیو <sup>b</sup> پولیو مانائٹیس																			
ہیپاٹائٹس B <sup>b</sup>																			
نیوموکی <sup>b</sup>																			
مینگوکوکس B <sup>d</sup>																			
خسرہ																			
گلسونے، جرمن خسرہ																			
چھوٹی چیچک ویریسلا																			
مینگوکوکل C																			
HPV ہیومن پاپیلوما وائرس																			
COVID-19 (کورونا وائرس ڈیزیز 2019)																			
برپز زوسٹر																			
انفلونزا انفلونزا																			

\* ٹیکہ کاریوں کو ٹیکہ کاری کی متعدد اپائنٹمنٹس میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔  
MMR اور V کو ایک ہی اپائنٹمنٹ میں یا 4 بقتے کے وقفے سے لگایا جا  
سکتا ہے۔

- 1 Td کی بوسٹر ٹیکہ کاری ہر 10 سال پر۔ اگلی مقررہ Td کی ٹیکہ کاری کے لیے Tdap کے بطور ایک خوراک، یا متعلقہ  
اشارے کی صورت میں، Tdap-IPV کی مرکب ٹیکہ کاری کے بطور مطلوب ہے۔  
2 MMR کے ٹیکے کے ساتھ یک وقتی ٹیکہ کاری ان تمام لوگوں کے لیے جن کی پیدائش 1970 کے بعد کی ہے یا 18 سال کی  
عمر نیز ٹیکہ کاری کی مہم حالت یا بچپن میں صرف ایک ٹیکہ کاری ہوئی ہو۔  
3 PCV20 کے ساتھ تجویز کردہ  
4 کسی بھی ضمنی بیماری سے محفوظ افراد کے تحفظ کے لیے، (کم از کم) 3 اینٹیجین ربط درکار ہوتے ہیں، جن میں سے کم از کم ایک  
لازمًا ویکسینیشن ہونی چاہیے۔  
5 23 ویلنٹ پولی سکرائیڈ کے ٹیکہ کے ساتھ ٹیکہ کاری۔

- 6 ٹیکہ کی پہلی خوراک زیادہ سے زیادہ 6 بقتے کی عمر میں؛ استعمال شدہ ٹیکے کے لحاظ سے ٹیکوں کی 2 یا 3 خوراکیں کم  
از کم 4 بقتے کے وقفے سے۔  
7 قبل از وقت پیدا ہونے والے شیر خوار: 3 ماہ کی عمر میں اضافی ٹیکے کی خوراک، یعنی ٹیکے کی کل 4 خوراکیں۔  
8 پہلی خوراک سے کم از کم فاصلہ: 6 ماہ۔  
9 2 سے 23 ماہ کی عمر تک 3 خوراکیں؛ 24 ماہ کی عمر سے، ویکسینیشن کی سیریز 2 خوراکیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔  
10 ٹیکے کی دو خوراکیں کم از کم 5 ماہ کے وقفے سے؛ تلافی والے امیونائزیشن کی صورت میں جس کی شروعات < 14 سال  
کی عمر میں یا پہلی اور دوسری خوراک کے بیچ > 5 ماہ کے ٹیکہ کاری کے وقفے سے ہو، ایک تیسری خوراک ضروری  
ہے۔